Todo Acerca del Tratamiento del Herpes Genital y Sintomas

El herpes genital se denomina a un grupo de enfermedades virales, enfermedades de transmisión sexual, es bastante generalizado en todo el mundo. Según las estadísticas actuales, el herpes genital de una forma u otra la sufren alrededor del 20% de toda la población adulta de nuestro planeta. La infección por esta enfermedad se produce por cualquier tipo de contacto sexual, cuando la infección entra en el cuerpo a través de la mucosa y microtraumas en la piel, así como a través de transfusiones de sangre y en el útero.

A pesar de pertenecer al grupo de las infecciones de transmisión sexual, el herpes genital puede ser llamado enfermedad condicionalmente segura: no es fatal, porque no está allí es una violación de los órganos internos y casi nunca es una la razón para la infertilidad.

Sin embargo, el herpes genital es una enfermedad muy desagradable que causa una gran cantidad de molestias para el paciente y pacientes con problemas graves, incluida la social y psicológica.

Cuales Son los Sintomas del Herpes Genital

Dependiendo del tiempo que ha transcurrido desde el momento de la infección, la enfermedad puede tener una forma primaria o recurrente.

El herpes genital primario puede pasar sin dar muestras de síntomas. En el caso donde la enfermedad se presenta sin otras manifestaciones de síntomas de la infección por el virus que pueden hablar – una forma especial de la enfermedad es cuando el paciente no experimenta ningún síntoma de la enfermedad y, de hecho, no recibe el menor daño posible, sin embargo, sigue siendo potencialmente contagiosa a otras personas.

Pero podría haber otra opción: después de 1 – 10 días después de la infección aparecen los primeros síntomas obvios, que incluyen:

- formación de erosión o ulceración, cuando pasa un par de días más tarde (dos y cuatro días) el contenido de burbujas sale;
- erupción en las superficies de las mucosas de los órganos genitales, así como las áreas de la piel adyacente a la misma en forma de burbujas con un característico grupo de enrojecimiento alrededor de ellos;
- ardor, picazón e hinchazón en el área de las futuras erupciones viene como un presagio de la enfermedad. Eso puede ser para todo el período de exacerbación;
- nódulos linfáticos inflamados en el área de la ingle, acompañado de debilidad y fiebre.

Seguir leyendo haciendo clic aqui